

# Gödselregler ("nitratförordningen" VNa 1250/2014)):



Lagring av stallgödsel:

## Gödselplatta:

- normvärdena för mängden gödsel, som beroende på djurslag, uppkommer under ett år har ändrats
- om det produceras minst 25 kubik fast gödsel totalt under ett år på gården eller gården mottar minst 25 kubik fast gödsel, skall gården ha gödselstad och gödselanalys (lösligt N, total N och total P)
- om mindre mängder lagras duger ett tätt lagringsutrymme med tak eller med presenning
- t.ex. 2 hästar eller 3 ponnyn, som är på bete dygnet runt i minst 4 mån producerar c. 24 kubik och under 25 kubik produceras även av 28 får (samma betesperiod)
- lagring för 12 månader (gemensamma lagringsplatser och djupstöbäddar räknas med). Lagringsutrymmet kan minskas med den mängd som produceras under betesperioden, dock för max 4 mån
- gödselplatta krävs också för totala mängden mottagen gödsel (minst 25 kubik) om inte gödseln (minst 30 % torrsubstans) lagras direkt på åkern tills spridningen (max 4 veckor)

| DJUR                                                | FLYTGÖD<br>SEL | STRÖGÖDSEL<br>GÖDSEL FRÅN<br>STRÖBÄDD | TORRGÖDS<br>EL | URIN |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------|
| Mjölkkko (8500 kg) <sup>1</sup>                     | 25,5           | 28,6                                  | 15,8           | 8,7  |
| Kviga                                               | 8,5            | 13,4                                  | 6,6            | 2,9  |
| Diko                                                | 19,0           | 20,4                                  | 16,9           | 1,9  |
| Köttboskap, Tjur                                    | 12,1           | 12,9                                  | 10,1           | 1,7  |
| Kokalv 6–12 mån.                                    | 7,2            | 9,7                                   | 6,1            | 1,7  |
| Kokalv 6 mån.                                       | 3,6            | 6,1                                   | 3,1            | 1,1  |
| Tjurkalv 6–12 mån.                                  | 9,5            | 12,1                                  | 8,0            | 2,1  |
| Tjurkalv 6 mån.                                     | 4,7            | 7,1                                   | 4,0            | 1,3  |
| Gödsvin <sup>2,3</sup>                              | 2,4            | 3,0                                   | 1,0            | 1,6  |
| Sugga och grisar <sup>4</sup>                       | 9,3            | 10,7                                  | 2,2            | 6,8  |
| Sugga och grisar i<br>satellitvinstall <sup>5</sup> | 12,7           | 15,5                                  | 3,5            | 10,4 |
| Sinsugga                                            | 3,9            | 4,9                                   | 1,6            | 2,7  |
| Avvand gris <sup>6</sup>                            | 1,2            | 1,6                                   | 0,6            | 0,8  |
| Galt (fullvuxen)                                    | 4,9            | 6,1                                   | 1,8            | 3,5  |
| Broiler <sup>2</sup>                                | -              | 0,015                                 | -              | -    |
| Värphöna, Broilerhona                               | -              | 0,04                                  | -              | -    |
| Kalkon <sup>2</sup>                                 | -              | 0,06                                  | -              | -    |
| Anka, Gås <sup>2</sup>                              | -              | 0,04                                  | -              | -    |
| And <sup>2</sup>                                    | -              | 0,025                                 | -              | -    |
| Får och lamm                                        | -              | 1,3                                   | -              | -    |
| Getter och killingar                                | -              | 1,3                                   | -              | -    |
| Lamm och killingar 3–9 mån. <sup>7</sup>            | -              | 1,3                                   | -              | -    |

VÄND!

## Stackning:

- om torrsubstansen är minst 30 %, kan gödseln stackas
  - förbjudet att ha stack under tiden 1.11 t.o.m. 31.1
  - utan lov i fyra veckor i väntan på spridning
  - med lov från kommun senast 14 dagar före stackningen
  - en stack måste finnas minst 100 m från ett vattendrag, utfall eller hushållsvattenbrunn, och inte heller närmare än 5 m från dike, inte på grundvattenområde och inte heller på åkrar som kan bli översvämmade
  - ska finnas ett 20 cm lager med absorberande material under stacken och ett tätt täcke över (plast eller presenning)
  - i en stack ska finnas gödsel för minst 1 ha och högst för hela skiftet
  - ska spridas under året

## Användning av stallgödsel:

### Gödselspridning:

- förbjudet från 1.11 t.o.m 31.3
- totalkväve högst 170 kg/ha/år (organisk gödsel)
- gödsel får inte spridas på snö eller vattendränkt mark
- ingen gödsling alls på 5 m från vattendrag, nästa 5 m får inte ytgödslas med organiskt material, om det inte myllas ner inom ett dygn
- på områden som lutar 15 % (13,5 grader) eller mer, får inte organiskt material spridas
- runt brunnar och källor varifrån hushållsvatten tas skall lämnas en zon på mellan 30 och 100 meter där ingen organisk gödsel får spridas
- lösligt N på mer än 150 kg/ha, måste delas på 2 givor med minst 2 veckor emellan
- stallgödsel eller annan organiskt material, som ytsprids, skall brukas ner inom ett dygn
- Gödsling 1.9 och senare räknas som höstgödsling
- Stallgödsel och annat organiskt material får efter 1.9 spridas högst 35 kg/ha lösligt N
- höstråg och höstvete = 30 kg/ha lösligt N på hösten
- ett skifte som skall vara växttäckt över vintern, kan inte ytgödslas med organiskt material fr.o.m. 15.9 (endast med nermyllning)